


Átlagos terápiás hossz vizsgálatok a hypertonia kezelésében

dr. Dietz Gergely, Somogyi Judit

A vizsgálat célja

- Tényadatok alapján, megbízható módon vizsgálni a hypertonia kezelés realitásait
- Elemezni a leggyakoribb terápiákat
- Vizsgálni a lemorzsolódást
- Tanulmányozni a hypertonia kezelés hosszát

DoktorInfo adatbázis



A DoktorInfo adatbázis:

- Háziorvosi vényfelírási adatokat gyűjt
- Országosan reprezentatív (850 háziorvos)
- Longitudinális betegkövetésre alkalmas
- 1 900 000 beteg adatai
- Komorbiditás vizsgálható
- Kombinációs terápiák elemezhetőek


Kutatási módszertan

A felhasznált adatok

- Kiválasztott házi orvosok száma: $n = 459$ (reprezentatív minta)
- Teljes időszak: 2008. május 1. – 2010. június 1.
- Hypertonia betegek száma: 314 673 fő
- Hypertonia betegek demográfiai és terápia analízise – gyakori terápiák meghatározása
- A vizsgált időszak: 2009. január 1. – 2009. május 31. – új betegek
- Időszak alatt új betegek száma: 26 342 fő


Metodika

- Kiválasztás kritériuma: Minden olyan hipertonia diagnózist és antitenzív készítményt kapó beteg akinek nem volt hasonló diagnózisa és terápiája a megelőző időszakban.
- Terápiakövetés az időszak végéig – LOT analízis korigált specifikus annuitás képlettel





Hypertonia terápia analízis

A leggyakrabban alkalmazott terápiák




A monoterápia és a kombinációs kezelés



Perzisztencia

Definíció: Adott időszak elteltével a vizsgált terápián maradt betegek százalékos aránya


A hipertónia perzisztenciája*



- Az ACEI kezdeti lemorzsolódása nagyobb, mint a másik két terápiáé
- BRB-nél a lemorzsolódás, jellemzően 2 hónap alatt megy végbe, 2 havi receptet kapnak a betegek?
- A BRB az első két hónap után lineáris, egyezik a hipertónia diagnózissal


- A betegek 5%-a első alkalom után lemorzsolódik
- Az éves lemorzsolódás 10%
- Az első két hónap kulcsfontosságú

A leggyakoribb terápiák perzisztenciája*



* Szűrve a helyettesítések
Korrigálva az orvos váltások
Korrigálva az ellátottsággal (2-3-6 hónap)

Várható terápiás hossz



Definíció:

Az adott terápián töltött várható átlagos idő – hónapban.

- A BRB terápia várhatóan rövidebb lesz, mint az ACEI (kezdeti lemorzsolódás korrekció után)
- Hosszú terápiás idők!

Konklúzió

- A betegek **37,5 % -a monoterápiát** kap
- A leggyakrabban alkalmazott terápia az **ACEI monoterápia 12,9%**
- A **hypertonia lemorzsolódása nagyobb**, mint a teljes krónikus beteg lemorzsolódás
- A **BRB terápia lemorzsolódása kisebb**, mint az ACEI terápiaé
- Az összes **ACEI várható terápiás hossza nagyobb**, mint a BRB-é

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

**Dr Dietz Gergely
DoktorInfo Kft
+06307393868**